

ЯК ЗАПОБІГТИ ІНФІКУВАННЮ?




Уникайте доступу людей, транспортних засобів та обладнання до стада



Забезпечте періодичну дезінфекцію місць утримання тварин, обладнання, одягу та взуття



Не купуйте тварин без ветеринарних документів



Ізолюйте новозаведених тварин



Забезпечте належну утилізацію гною, сміття та мертвих тварин



Повідомляйте ветеринарну службу про виявлених мертвих кабанів та диких жуйних тварин

ЩО РОБИТИ У РАЗІ ПІДОЗРИ СПАЛАХУ ХВОРОБИ?



Ізолюйте всіх тварин, які підозрюються в інфікуванні



Регулярно прибирайте та зберігайте ізольованими: гній, залишки корму та підстилку



Застосуйте відповідні додаткові заходи біобезпеки для уникнення ризику поширення хвороби



Припиніть усе переміщення тварин до або з господарства



Надайте компетентному органу всю відповідну інформацію щодо хвороби



Дотримуйтеся інструкцій щодо контролю хвороби, наданих компетентним органом



[ЯЩУР]

НА ПОДВІРНИХ ГОСПОДАРСТВАХ



Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу

ЩО ТАКЕ ЯЩУР?

ЯЩУР – це висококонтагіозна вірусна хвороба, яка вражає здебільшого велику рогату худобу та свиней, проте також може вражати овець, кіз та інших парнокопитних жуйних тварин

Понад **60 штамів**

Люди можуть хворіти на ящур та здатні переносити вірус у респіраторному тракті **протягом 24-48 годин**

Має сильний вплив на **сільське господарство та секторальну економіку**




Спалах хвороби в країні миттєво викличе заборону експорту тварин і тваринної продукції до всіх країн, вільних від ящуру

Хвороба може призводити до **летальних випадків** серед дорослих тварин

Має здатність **швидко поширюватися** на значні території


У разі інфікування молодняку - може спостерігатися **високий падіж**

ЯК ПЕРЕДАЄТЬСЯ ЯЩУР?



Прямий контакт із інфікованими свійськими або дикими тваринами

Виділяється через дихання, зі слини, фекалій та сечі, молока та сперми (за 4 дні до появи клінічних ознак)



Забруднені продукти тваринного походження


Здатний до виживання від одного дня до декількох тижнів в органічній матерії

- ◆ необроблені забруднені м'ясні продукти (згодовування харчових відходів)
- ◆ забруднене молоко



Через предмети, фоміти або ятрогенно

Забруднений одяг, взуття, обладнання чи матеріали (сіно, корм, вода, молоко або біопрепарати)



Може передаватися повітрям (вітром)

Низькі температури та висока вологість сприяють передачі вірусу вітром (до 60 км - сушею, 300 км - морем)


ІНКУБАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
від декількох днів до 2 тижнів

ЯК РОЗПІЗНАТИ ЯЩУР?

Важкість клінічних ознак залежатиме від штаму вірусу, віку, виду та породи інфікованих тварин

ЗАГАЛЬНІ КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ

✚ Везикули та ураження



✚ Слиновиділення

✚ Анорексія

✚ Кульгавість

✚ Лихоманка

✚ Знижена молочна продуктивність

✚ Аборт і раптова загибель новонародженого молодняку



У разі підозри щодо наявності хвороби у свійських або диких тварин, негайно повідомте про це Держпродспоживслужбу* у вашому районі або області


*Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Сайт служби dpss.gov.ua

ЯЩУР НА ПОДВІРНИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Висококонтагіозна вірусна хвороба, яка вражає велику рогату худобу, свиней, овець, кіз та інших парнокопитних жуйних тварин



ЯК ЗАПОБІГТИ ІНФІКУВАННЮ?

-  контроль за доступом людей до тварин та обладнання
-  належна утилізація гною, сміття та мертвих тварин
-  санітарна обробка будівель, транспортних засобів та обладнання
-  контроль ввезення нових тварин



У разі підозри щодо наявності хвороби у свійських або диких тварин, негайно повідомте про це Держпродспоживслужбу

ЯК ЗАПОБІГТИ ІНФІКУВАННЮ?



Дотримуйтеся суворого контролю доступу людей, транспортних засобів та обладнання до стада



Забезпечте дезінфекцію місць утримання тварин, обладнання, одягу та взуття



Дотримуйтеся обов'язкового профілактичного карантинування під час переміщення тварин до або з господарства



Забезпечте належну утилізацію гною, сміття та мертвих тварин



Повідомляйте ветеринарну службу про виявлених мертвих кабанів та диких жуйних тварин

ЩО РОБИТИ У РАЗІ ПІДОЗРИ СПАЛАХУ ХВОРОБИ?



Ізольуйте всіх тварин, які підозрюються в інфікуванні



Регулярно прибирайте та зберігайте ізольованими: гній, залишки корму та підстилку



Застосуйте відповідні додаткові заходи біобезпеки для уникнення ризику поширення хвороби



Припиніть усе переміщення тварин до або з господарства



Надайте компетентному органу всю відповідну інформацію щодо хвороби



Дотримуйтеся інструкцій щодо контролю хвороби, наданих компетентним органом



[ЯЩУР]
НА КОМЕРЦІЙНИХ ГОСПОДАРСТВАХ



Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу

ЩО ТАКЕ ЯЩУР?

ЯЩУР – це висококонтагіозна вірусна хвороба, яка вражає здебільшого велику рогату худобу та свиней, проте також може вражати овець, кіз та інших парнокопитних жуйних тварин

Понад **60 штамів**

Люди можуть хворіти на ящур та здатні переносити вірус у респіраторному тракті **протягом 24-48 годин**

Має сильний вплив на **сільське господарство та секторальну економіку**




Спалах хвороби в країні миттєво викличе заборону експорту тварин і тваринної продукції до всіх країн, вільних від ящуру

Хвороба може призводити до **летальних випадків** серед дорослих тварин

Має здатність **швидко поширюватися** на значні території

У разі інфікування молодняку - може спостерігатися **високий падіж**

ЯК ПЕРЕДАЄТЬСЯ ЯЩУР?



Прямий контакт із інфікованими свійськими або дикими тваринами

Виділяється через дихання, зі слини, фекалій та сечі, молока та сперми (за 4 дні до появи клінічних ознак)



Забруднені продукти тваринного походження


Здатний до виживання від одного дня до декількох тижнів в органічній матерії

- ◆ необроблені забруднені м'ясні продукти (згодовування харчових відходів)
- ◆ забруднене молоко



Через предмети, фоміти або ятрогенно

Забруднений одяг, взуття, обладнання чи матеріали (сіно, корм, вода, молоко або біопрепарати)



Може передаватися повітрям (вітром)

Низькі температури та висока вологість сприяють передачі вірусу вітром (до 60 км - сушею, 300 км - морем)


ІНКУБАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
від декількох днів до 2 тижнів

ЯК РОЗПІЗНАТИ ЯЩУР?

Важкість клінічних ознак залежатиме від штамів вірусу, віку, виду та породи інфікованих тварин

ЗАГАЛЬНІ КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ

✚ Везикули та ураження



✚ Слиновиділення

✚ Анорексія

✚ Кульгавість

✚ Лихоманка

✚ Знижена молочна продуктивність

✚ Аборт і раптова загибель новонародженого молодняку




У разі підозри щодо наявності хвороби у свійських або диких тварин, негайно повідомте про це Держпродспоживслужбу* у вашому районі або області

*Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Сайт служби dpss.gov.ua

ЯЩУР НА КОМЕРЦІЙНИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Висококонтагіозна вірусна хвороба, яка вражає велику рогату худобу, свиней, овець, кіз та інших парнокопитних жувальних тварин



Для уникнення ризику занесення ящуру з закордону, ввозьте тварин тільки з благополучних щодо вірусу ящуру країн



ЯК ЗАПОБІГТИ ІНФІКУВАННЮ?




контроль за доступом людей до тварин та обладнання



належна утилізація гною, сміття та мертвих тварин



санітарна обробка будівель, транспортних засобів та обладнання



контроль ввезення нових тварин



У разі підозри щодо наявності хвороби у свійських або диких тварин, негайно повідомте про це Держпродспоживслужбу

ЯК ЗАПОБІГТИ ІНФІКУВАННЮ?



Дотримуйтеся
суворого контролю
доступу людей та
транспортних засобів
до обладнання



Мийте та дезінфікуйте
транспортні засоби
кожного разу, коли
вони потрапляють на
потужності



Проведіть навчання
для персоналу щодо
заходів біобезпеки з
метою попередження
ящуру



ЯЩУР

РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ НА ПОТУЖНОСТЯХ
ІЗ ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ



**У разі підозри щодо
наявності хвороби,
негайно повідомте про
це Держпродспоживслужбу* у
вашому районі або області**



Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу

*Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Сайт служби dpss.gov.ua



ЩО ТАКЕ ЯЩУР?

ЯЩУР – це висококонтагіозна вірусна хвороба, яка вражає здебільшого велику рогату худобу та свиней, проте також може вражати овець, кіз та інших парнокопитних жуйних тварин

Понад **60 штамів**

Люди можуть хворіти на ящур та здатні переносити вірус у респіраторному тракті **протягом 24-48 годин**

Може мати сильний вплив на **сільське господарство та секторальну економіку**



Спалах хвороби в країні миттєво викличе заборону експорту тварин і тваринної продукції до всіх країн, вільних від ящуру

Хвороба має здатність **швидко поширюватися** на значні території

ЯК ПЕРЕДАЄТЬСЯ ЯЩУР?



Забруднені кормові інгредієнти

Здатний до виживання від одного дня до декількох тижнів в органічній матерії



Через предмети, фоміти або ятрогенно

Забруднений одяг, взуття, обладнання чи транспорт

Хвороба може виживати в забрудненому **кормі та середовищі до 1 місяця** залежно від температури та рівня pH

ІНКУБАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
від декількох днів до 2 тижнів

Висококонтагіозна вірусна хвороба, яка вражає велику рогату худобу, свиней, овець, кіз та інших парнокопитних жуйних тварин



ЯК ЗАПОБІГТИ ІНФІКУВАННЮ?



контроль за доступом
людей та транспортних
засобів до обладнання



навчання для
персоналу щодо
заходів біобезпеки



санітарна обробка
приміщень, транспортних
засобів та обладнання



У разі підозри щодо наявності хвороби, негайно повідомте про це
Держпродспоживслужбу

ЯК ЗАПОБІГТИ ІНФІКУВАННЮ?



Мийте та дезінфікуйте транспортні засоби після кожного перевезення



Проведіть навчання для персоналу щодо заходів біобезпеки з метою попередження ящуру



Повідомляйте ветеринарну службу про виявлених мертвих кабанів та диких жуйних тварин



Перевозьте тварин тільки з благополучних господарств



Перевозьте тільки здорових тварин за наявності ветеринарних документів

ЩО РОБИТИ У РАЗІ ПІДОЗРИ СПАЛАХУ ХВОРОБИ?



Ізольуйте всіх тварин, які підозрюються в інфікуванні



Регулярно прибирайте та зберігайте ізольованими: гній, залишки корму та підстилку




Застосуйте відповідні додаткові заходи біобезпеки для уникнення ризику поширення хвороби



Надайте компетентному органу всю відповідну інформацію щодо хвороби



Дотримуйтеся інструкцій щодо контролю хвороби, наданих компетентним органом



[ЯЩУР]
ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ХУДОБИ



Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу

ЩО ТАКЕ ЯЩУР?

ЯЩУР – це висококонтагіозна вірусна хвороба, яка вражає здебільшого велику рогату худобу та свиней, проте також може вражати овець, кіз та інших парнокопитних жуйних тварин

Понад **60 штамів**

Люди можуть хворіти на ящур та здатні переносити вірус у респіраторному тракті **протягом 24-48 годин**

Має сильний вплив на **сільське господарство та секторальну економіку**




Спалах хвороби в країні миттєво викличе заборону експорту тварин і тваринної продукції до всіх країн, вільних від ящуру

Хвороба може призводити до **летальних випадків** серед дорослих тварин

Має здатність **швидко поширюватися** на значні території


У разі інфікування молодняку - може спостерігатися **високий падіж**

ЯК ПЕРЕДАЄТЬСЯ ЯЩУР?



Прямий контакт із інфікованими свійськими або дикими тваринами

Виділяється через дихання, зі слини, фекалій та сечі, молока та сперми (за 4 дні до появи клінічних ознак)



Забруднені продукти тваринного походження


Здатний до виживання від одного дня до декількох тижнів в органічній матерії

- ◆ необроблені забруднені м'ясні продукти (згодовування харчових відходів)
- ◆ забруднене молоко



Через предмети, фоміти або ятрогенно

Забруднений одяг, взуття, обладнання чи матеріали (сіно, корм, вода, молоко або біопрепарати)



Може передаватися повітрям (вітром)

Низькі температури та висока вологість сприяють передачі вірусу вітром (до 60 км - сушею, 300 км - морем)


ІНКУБАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
від декількох днів до 2 тижнів

ЯК РОЗПІЗНАТИ ЯЩУР?

Важкість клінічних ознак залежатиме від штамів вірусу, віку, виду та породи інфікованих тварин

ЗАГАЛЬНІ КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ

✚ Везикули та ураження





- ✚ Слиновиділення
- ✚ Анорексія
- ✚ Кульгавість
- ✚ Лихоманка
- ✚ Знижена молочна продуктивність
- ✚ Аборт і раптова загибель новонародженого молодняку



У разі підозри щодо наявності хвороби у свійських або диких тварин, негайно повідомте про це Держпродспоживслужбу* у вашому районі або області

*Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Сайт служби dpss.gov.ua

КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ



Надмірне
слиновиділення



Ураження на
копитному віночку



Ураження на язика



Ураження на вимені

ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ ХВОРОБИ




прямий контакт із
інфікованими свійськими
або дикими тваринами



забруднені продукти
тваринного походження



через предмети, фоміти
або ятрогенно



може передаватися
повітрям (вітром)



**У разі підозри щодо наявності хвороби у свійських або диких тварин,
негайно повідомте про це Держпродспоживслужбу**